

ESTADISTICA
DE LA
PRODUCCION DE LEGUMINOSAS
EN 1939

La producción de leguminosas en 1939

La cosecha de leguminosas en 1939 ha sido, en cuanto a su volumen total, inferior a la media del quinquenio 1931-35.

A continuación se exponen los resultados generales del cultivo de las leguminosas de grano:

	SUPERFICIES			PRODUCCIONES		
	1931-35	1939		1931-35	1939	
	Hectáreas	Hectáreas	1931-35=100	Q. M.	Q. M.	1931-35=100
Secano	1.032.368	1.005.303	97,38	6.257.823	5.134.356	82,05
Regadío	111.833	100.462	89,83	1.483.641	1.240.294	83,60
Totales	1.144.201	1.105.765	96,64	7.741.464	6.374.650	82,34

La disminución de superficie en 1939 fué de 38.436 hectáreas, y la baja de producción, de 1.366.814 quintales métricos. Pero estas variaciones son muy inferiores, en valor relativo, a las experimentadas por los cereales de otoño en este mismo año y con respecto al mismo término de comparación. En efecto: mientras la superficie global dedicada a los cereales en 1939 acusa una disminución del 23,70 por 100 con relación a 1931-35, la superficie ocupada por las leguminosas de grano sólo bajó un 3,36 por 100.

Este dato cobraría toda su significación si hubiera sido posible registrar estadísticamente, con suficiente precisión, que la firmeza del cultivo de leguminosas y aun su ampliación para algunas especies—como ha ocurrido en las provincias que agrupamos bajo el título de **Zona nacional**—no se logró a costa de la superficie dedicada a los cereales, sino por ampliaciones de la hoja de leguminosas dentro de la alternativa cereal-leguminosa, y ello sin provocar un descenso de los rendimientos unitarios. Esta tendencia, cuyas oscilaciones se han registrado en ediciones anteriores del **Anuario Estadístico de las Producciones Agrícolas**, es de la mayor importancia y conveniencia, tanto desde el punto de vista de la

técnica agronómica, como en cuanto vía de solución de la escasez de alimentos en la postguerra sin recurrir a grandes alteraciones en el ordenamiento de las explotaciones agrícolas españolas.

Es importante analizar el resultado de la cosecha de leguminosas de 1939 atendiendo a la situación de cada provincia durante los años de nuestra Guerra de Liberación.

Agrupadas las provincias con arreglo al mismo criterio empleado para el cultivo de los cereales, encontramos el siguiente resultado comparativo con el quinquenio 1931-35, en cuanto a la superficie total sembrada de leguminosas de grano:

	ZONA NACIONAL	ZONA ROJA	ZONA DE GUERRA	ESPAÑA
Aumento (+) o disminución (—). (Hectáreas)	+ 54.471	— 20.182	— 72.725	— 38.436
Aumento (+) o disminución (—). (1931-35 = 100)	+ 7,61	— 16,78	— 26,61	— 3,36

Respecto al resultado de la producción, utilizando el mismo término comparativo, encontramos:

	ZONA NACIONAL	ZONA ROJA	ZONA DE GUERRA	ESPAÑA
Aumento (+) o disminución (—). (Quintales métricos)	— 296.110	— 217.920	— 852.784	— 1.366.814
Aumento (+) o disminución (—). (1931-35 = 100)	— 6,58	— 21,73	— 38,06	— 17,66

La zona nacional ha aumentado en cuantía apreciable la superficie sembrada, hasta el punto de compensar casi las fuertes reducciones de las superficies con igual destino en la zona roja y en la zona de guerra. Un año malo, en general, ha dejado a todas las provincias españolas por debajo de la cosecha media del quinquenio 1931-35. Sin embargo, en la zona nacional, las cosechas de garbanzos, lentejas, almortas, yeros, alverjones y alholvas superaron en 1939 a lo recolectado como promedio en 1931-35; y ha sido la deficientísima cosecha de habas la que desequilibra el balance de la producción de leguminosas en 1939. En las demás provincias, todos los cultivos acusan baja, excepto el del garbanzo en la zona roja. Esta planta, que en tan alta proporción interviene en la dieta


de la población española, ofrece el cuadro siguiente de variaciones, si se compara la cosecha de 1939 con el promedio del quinquenio de referencia:

	ZONA NACIONAL	ZONA ROJA	ZONA DE GUERRA	ESPAÑA
Aumento de la superficie. (Hectáreas)	+ 10.690	+ 6.014	+ 14.650	+ 31.354
Aumento de la superficie. (1931-35 = 100).	+ 8,36	+ 27,95	+ 16,53	+ 13,17
Aumento (+) o disminución (—) de la producción. (Quintales métricos).	+ 187.298	+ 16.829	— 3.280	+ 200.847
Aumento (+) o disminución (—) de la producción. (1931-35=100).	+ 31,57	+ 16,42	— 0,65	+ 16,71

De notar es la diferencia grande de rendimiento en favor del cultivo realizado en la zona nacional.

Este aumento tan señalado en el cultivo del garbanzo y los importantes acrecimientos de la superficie sembrada de lentejas y judías en la zona nacional se deben probablemente a un aumento de la demanda, que ya se hizo notar como tendencia antes de la guerra, y que durante ésta se ha reforzado por la movilización y la falta de otros productos básicos: arroz en la zona nacional (por cultivarse todo en la zona roja) y pan en las otras provincias (por desorganización, depredaciones y efectos directos de la lucha).

En este sector de la producción agrícola, la iniciativa espontánea de los agricultores enclavados en la que ha sido zona nacional ha aumentado en 65.667 hectáreas las dedicadas a las legumbres que se destinan exclusivamente a la alimentación humana, orientación ésta que coincide con el interés nacional, puesto que atiende a asegurar el



alimento de la población española en aquellos mantenimientos: los vegetales, que sòn siempre primordiales en España y en todas partes en los tiempos de crisis.

Aunque—refiriéndonos otra vez a toda España—la contracción del cultivo de leguminosas ha sido mayor, en valor absoluto, en el secano que en el regadío, la reducción de la superficie cultivada en secano no ha pasado del 2,62 por 100, mientras que la del regadío ha sido del 10,17 por 100.

Las variaciones totales indicadas al principio de este comentario son el resultado de las sufridas por cada especie, las cuales presentan diverso signo. Comparadas las superficies y producciones de 1939 con los promedios correspondientes a 1931-35, tenemos los aumentos (+) o disminuciones (—) siguientes:

	1939	
	SUPERFICIE Hectáreas	PRODUCCION Q. M.
Habas	— 39.228	— 799.071
Algarrobas	— 24.985	— 397.801
Lentejas.	— 1.044	— 13.659
Yeros	— 18.428	— 74.458
Almortas	— 4.290	— 22.009
Altramuces	— 2.166	— 27.279
Guisantes.	— 13.813	— 65.157
Veza.	— 6.187	— 61.314
Alverjones.	— 2.666	— 15.524
Garbanzos	+ 31.354	+ 200.847
Judías	+ 42.536	— 117.269
Alholvas	+ 483	+ 25.882
Diferencia total	— 38.434	— 1.366.812

Sólo los garbanzos, las judías y las alholvas han ocupado el año 1939 mayor extensión que la media correspondiente al quinquenio 1931-35.


Las mayores variaciones absolutas han afectado, como se ve, a las habas, a las algarrobas, a los garbanzos y a las judías, y las relativas, referidas al mismo quinquenio, han sido, en cuanto a superficie de cultivo, las siguientes:

	REDUCCION	AUMENTO
	Por 100	Por 100
Guisantes.	23,93	—
Alverjones.	22,01	—
Habas.	19,48	—
Yeros	18,90	—
Veza.	15,27	—
Altramuces	13,03	—
Almortas	12,98	—
Algarrobas	12,14	—
Lentejas.	4,60	—
Judías	—	19,98
Garbanzos	—	13,18
Alholvas	—	8,21

El mayor aumento de la superficie dedicada a garbanzos se ha registrado en Andalucía Occidental, con 36.414 hectáreas, y en donde la extensión total, en relación con la del quinquenio, ha representado el 154,54 por 100. Incrementos absolutos de 3.374, de 2.757 y de 3.661 hectáreas se han dado en Andalucía Oriental, León y Extremadura, y bajas importantes, cifradas en su totalidad en 13.975 hectáreas, en ambas Castillas.

La mayor extensión ocupada por las judías ha sido obra de los incrementos extraordinarios en las regiones gallega y leonesa, que ascienden a 54.094 y 5.537 hectáreas, y han representado, en relación con el quinquenio 1931-35, el 165,82 y el 170,87 por 100, respectivamente. Disminuciones se acusan en Asturias y Santander, Andalucía, Aragón, Castilla la Nueva y Cataluña.

El aumento de la producción de garbanzos se debe a Andalucía y León. En cuanto a las judías, a pesar de la reducción global de la cosecha, la producción superó a la del quinquenio 1931-35 en León, Vascongadas y Andalucía Occidental, destacándose por su importancia absoluta y relativa la de la primera de dichas regiones, cuyo aumento al-



canzó la cantidad de 97.529 quintales métricos, lo que representa un incremento de 124,22 por 100 con relación a la cosecha del citado quinquenio.

Si la comparación se realiza agrupando los cultivos por el destino de los productos, se observa que las legumbres destinadas a piensos han alcanzado una producción de 3.137.150 quintales métricos, o sea el 69,58 por 100 de la de 1931-35, cuando la superficie ocupada por las mismas llegó al 84,10 por 100. En cambio, las correspondientes a la alimentación humana han aumentado en extensión en un 11,11 por 100, y la producción total ha sido aproximadamente igual a la media anual de dicho período.

