




Tras las HUELLAS de los DINOSAURIOS

La Reserva de la Biosfera de los valles del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama, declarada como tal el 9 de julio de 2003, comprende un total 40 municipios situados en la mitad suroriental de La Rioja. De ellos, hay 26 términos municipales que están incluidos totalmente en la reserva: Aguilar del río Alhama, Ajamil, Arnedillo, Cabezón de Cameros, Cervera del río Alhama, Cornago, Enciso, Grávalos, Hornillos de Cameros, Igea, Jalón de Cameros, Laguna de Cameros, Muni-lla, Muro de Aguas, Muro en Cameros, Navajún, Préjano, Rabanera, Robres del Castillo, San Román de Cameros, Soto en Cameros, Terroba, Torre en Cameros, Valdemadera, Villarroya, Zarzosa. Además, los 14 restantes sólo lo están parcialmente: Alfaro, Arnedo, Autol, Bergasa, Bergasilla Bajera, Clavijo, Herce, Lagunilla del Jubera, Leza del río Leza, Ocón, Quel, Ribafrecha, Santa Engracia del Jubera, Santa Eulalia Bajera.

Esta reserva ocupa una superficie de 116.669 hectáreas, casi la cuarta parte de la comunidad. De esa superficie, 5.537 has ocupan las zonas núcleo; 11.760 has son zonas periféricas; y las 102.372 has restantes, zonas de transición.

En cuanto a la población, en la zona núcleo de la reserva sólo habitan 444 personas de forma habitual, aunque puede oscilar hasta 1.000 habitantes según la estación; en la denominada zona tampón, el número

de habitantes habituales oscila entre 800 y 1.200; y en la zona de transición, entre 8.000 y 14.000, según la estación.



Actividades humanas

La población asentada en el territorio de la reserva utiliza de manera tradicional los recursos naturales de la zona para la práctica de la ganadería extensiva (oveja y vaca), la agricultura de secano (cereal, olivo, almendro y vid) y la agricultura hortofrutícola en

La Rioja

Localización concreta:

La reserva se halla situada en la mitad suroriental de La Rioja.

Superficie:

116.669 hectáreas.

Fecha de nombramiento como

Reserva de la Biosfera:

2003.

Localización para llegar:

A través de Logroño y Villamediana se accede por la LR-250 al valle del río Leza. Para los tres valles restantes, seguir desde la capital riojana por la N-232, dirección Zaragoza: en Agoncillo, seguir a la derecha por la LR-261 para el valle de Jubera; en Calahorra, a la derecha, por la LR-134 se llega hasta Arnedo, desde donde se accede al valle del Cidacos siguiendo la misma carretera, o bien al del Alhama si se sigue, a la izquierda, la LR-123.

Principales valores naturales:

Varias zonas de Especial Protección para las Aves, con roquedos, cortados y cañones fluviales y paisaje de bosque mediterráneo y pastos. Utilización humana de los recursos naturales desde tiempos muy antiguos. Restos fósiles de dinosaurios.

Texto:

José Ignacio Rodríguez.

Fotos:

Daniel P. Acevedo.



las escasas zonas de vega situadas en los fondos irrigados de valle.

Más recientemente ha incrementado su importancia el sector servicios

en el interior de la reserva y se localiza en los pueblos de la periferia mejor comunicados con el corredor del Ebro (Arnedo por ejemplo). Por otro

ña Isasa y Peñalmonte; y Sierra de Alcarama y Valle del Alhama. Todas ellas están propuestas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) -de los que La

Rioja cuenta ya con un total de 153.227 hectáreas- para ser incluidas en la Red Natura 2000.

Características ecológicas

La reserva se halla situada en la mitad suroriental de La Rioja. La mayor parte se encuentra cubierta de matorrales mediterráneos de sustitución (romeales, tomillares, jarales, aulagares), pero todavía alberga algunos reductos bien conservados de bosques de encina (*Quercus ilex*), roble (*Q. pyrenaica* y *Q. faginea*) y haya (*Fagus silvatica*) que en su día la poblaban, y que hoy están regenerándose gracias a la menor presión humana que soportan las zonas de mayor pendiente.

Entre los diferentes y variados paisajes podemos destacar los roquedos, cortados rocosos y cañones fluviales como las Peñas de Arnedillo-Peñaisasa-Peñalmonte, las Peñas de Iregua-Leza-Jubera y la Sierra del Tormo, que constituyen el hábitat idóneo de nidificación para

las aves rupícolas como el águila perdicera (*Hieraetus fasciatus*), el buitre leonado (*Gyps fulvus*), el buho real (*Bubo bubo*) y el alimoche (*Neophrom percnopterus*) entre otros.

Los bosques, matorrales, ríos y arroyos mantienen especies emblemáticas como el gato montés (*Felis*

basándose en el tradicional turismo de balneario (Arnedillo principalmente) complementado con un incipiente turismo rural asociado al patrimonio natural y cultural (yacimientos de icnitas, senderismo, monumentos, artesanía, etc.)

La actividad industrial es escasa

lado, existe una creciente actividad eólica y persisten todavía vestigios de la fabricación artesanal de alpargatas y lanas de pastor.

Cuenta con figuras de protección como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Peñas del Iregua, Jubera y Leza; Peñas de Arnedillo, Pe-





silvestris) o la nutria (*Lutra lutra*) y buenas poblaciones de ungulados como el ciervo (*Cervus elaphus*), el corzo (*Capreolus capreolus*) o el jabalí (*Sus scrofa*). En estas zonas también desarrollan su actividad endemismos peninsulares como el desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*), el eslizón ibérico (*Chalcides chalcides*), el sapillo pintojo (*Discoglossus galga-*

noi), el barbo de cola roja (*Barbus haasi*), la bermejuela (*Chondrostoma arcasii*), la loína (*Chondrostoma mieji*) o el cangrejo de río (*Austropotamobius pallipes*).

En toda la comarca existe uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa, con huellas y restos fósiles de dinosaurios y otras especies animales y vegetales (Enci-

so, Poyales, Cornago, Igea y Soto en Cameros). Igualmente los yacimientos arqueológicos de Contrebia Leukade son muestra de la presencia celtibérica.

Señalar, por último, que los huertos tradicionales generan un paisaje diferente y su sistema de riego es herencia de la cultura árabe presente en estas tierras hace siglos. 

