

UNA GRANJA DE SELECCIÓN MANEJADA EN BANDAS QUINCENALES DESDE 1983 EL MACHO TERMINAL IRTA:

*Oriol Rafel y Josep Ramon
IRTA Unitat de Cunicultura*


En el año 1983, al iniciarse el proceso de selección del Macho terminal IRTA nadie se podía imaginar la revolución que está siendo en estos momentos, el manejo en bandas. Es más, ni siquiera se conocía el concepto de manejo en bandas.

En la Unitat de Cunicultura del IRTA se planteó la necesidad de concentrar los destetes con el fin de disponer de un número suficiente de hembras en el mismo estado fisiológico para facilitar la indexación y con ello la selección.

Desde entonces, la granja que aloja el lote de selección funciona a bandas quincenales, aunque por razones de control de apareamientos sólo se agrupa regionalmente el cebo con un sistema de todo dentro todo fuera.

Esta concentración de destetes se ha conseguido a partir de una concentración de cubriciones los *lunes y martes de semanas alternas*, con palpaciones a los 13-14 días (lunes) y partos concentrados entre el miércoles y el viernes de la misma semana de cubriciones. Durante la semana siguiente, y también quincenalmente, se realizan los diversos controles, empezando por el destete (miércoles) en que se pesan y tatúan todos los gazapos. Se realiza también un control de peso a los 60 días de vida (martes), y diversas observaciones como índices de conversión, etc...

Este manejo en bandas quincenales con cubriciones los lunes y martes de semanas alternas



El mantenimiento de animales en las granjas con manejo en bandas ha de realizarse de forma eficaz.



Carro para el traslado de reproductoras. Pueden emplearse para llevar las hembras a cubrir al macho, en el desplazamiento de reproductores para formación de las bandas o para trasladar a los gazapos. Obsérvese la simplicidad del funcionamiento de la puerta.

se realiza en monta natural, gracias a que el lote de selección está compuesto por 96 hembras y 30 machos. Esta cantidad de machos, que parece exagerada, es fruto de las exigencias de la selección y no del manejo en bandas.

El manejo en bandas quincenales con monta natural y cubriciones dos días por semana, seguidos o no, exige, para granjas con fertilidades alrededor del 80%, un macho para cada cinco hembras si cada macho sirve a una única hembra al día. Esta proporción se reduce a un macho por cada diez hembras en el caso de controlar, de manera muy estricta, el número de saltos que realiza cada macho sirviendo a dos hembras cada día. ■