

SEMANARIO

DE AGRICULTURA Y ARTES

Del Jueves 11 de Junio de 1807.

Continuacion del Ensayo sobre las variedades &c.

TRIBU VIII.

PERRUNOS. FLAVENTES.

SARMIENTOS duros ó broncos: HOJAS de color amarillo parecido al del laton: UVAS apiñadas medianas casi redondas.

RAMI duri aut fragiles: FOLLA flavicantia: ACINI conferti mediocres subrotundi.

63. - PERRUNO COMUN. FLAVA.

PERRUNO en Sanlucar, Xerez, Trebugena, Chipiona, Rota, Puerto de Santa María Moguer y Algeciras.
PERRUNO TIERNO en Arcos, Paxarete y Espera.

SARMIENTOS sumamente broncos: *pezon fragil*: UVAS de color amarillo de laton duras.

RAMIS eximie fragilibus: pedunculo fragili: ACINIS flavis duris.

CEPA muy gruesa, brota temprano.

SARMIENTOS muchos, erguidos ó casi erguidos, algo cortos, gruesos, nada ondeados, rollizos, enteramente lampiños, de color rojo-parduzco algo claro: *cañutos* largos: *rebuscos* muy pocos.

HOJAS medianas, algo irregulares, casi enteras, ra-

ra vez lobadas; con los *senos* comunmente agudos, algo lustrosas en su parte superior, pelosas en la inferior; con los *pelos* cortos y á veces bastante espesos en las inferiores, caen temprano: *dientes* medianos. CABILLO grueso, algo peloso, de color blanco-parduzco ó pardo de madera muy claro que á veces tira á rojo, en ángulo casi recto con la hoja.

RACIMOS muchos, á veces pocos, grandes; con poco *agracejo*. PEZON sumamente tierno, blanco-verdoso.

UVAS de siete líneas y media de largo con casi otro tanto de grueso, algo trasovadas, muy obtusas, con la superficie igual, muy traslucientes, ásperas, muy tardías: *venas* muy manifiestas: *hollejo* grueso. ANILLO circular, pardo-rojizo.

Pesó su mosto en 19 de Septiembre 12 grados.

Es la mas estimada para vinos despues del Listan comun, Ximenez comun y los Moscateles.

Ocupa una mitad de las viñas de Trebugena, un tercio de las de Xerez y muchas manchas en las de Sanlucar, Puerto de Santa María, Arcos, Espera, Paxarete, Moguer y Algeciras.

Tambien se cultiva en Rota y Chipiona.

64. - PERRUNO NEGRO. ROZIERII (1).

PERRUNO NEGRO en Sanlucar, Xerez y Trebugena.

MORAVITA en Arcos y Espera.

GRANADINA en Paxarete.

SARMIENTOS muy broncos: *pezon* fragil: *UVAS* negras duras.

RAMIS valde fragilibus: *pedunculo fragili*: *ACINIS nigris duris*.

BLACK CLUSTER GRAPE. Langley, loc. cit. Lam. 42, fig. 2. pag. 115?

Solo diere de la variedad anterior por sus SARMIEN-

(1) Dedico esta variedad al célebre ROZIER, uno de los Ampelografos mas instruidos, y acaso el mas zeloso por los progresos de la ciencia.

TOS mas largos y algo menos broncos: estos y los CABILLOS mas rojos: RACIMOS algo mayores y mas apretados: UVAS negro-rojizas, menos ásperas y de mosto menos pesado (10 grados en Sanlúcar en 19 de Setiembre).

Se encuentran algunas cepas de este vidueño en todos los pueblos nombrados arriba.

65. - QUINTINIEA. *QUINTINIEA* (1).

SARMIENTOS muy broncos: pezon duro: UVAS negras algo duras.

RAMIS valde fragilibus: pedunculo duro: ACINIS nigris duriusculis.

Difiere ademas de la anterior por sus SARMIENTOS algo mas cortos, blanquizcos: HOJAS algo mayores, mas delgadas, con los dientes mas cortos, con muy raro pelo, de color algo mas oscuro, con los nervios menos gruesos: RACIMOS en menor número, mas chicos, mas apretados, sin agracejo, y de PEZON mas corto: UVAS mas pequeñas y redondas, de hollejo mas delgado y mas tardías.

Se cultiva en Maina, pago de Sanlúcar.

66. - BERNALA. *BERNALA* (2).

SARMIENTOS muy broncos: UVAS negras blandas.

RAMIS valde fragilibus: ACINIS nigris mollibus.

Difiere ademas del Perruno comun por sus SARMIENTOS menos erguidos y de color pardo-rojizo subido: HOJAS algo mayores, con los senos menos profundos y los dientes mas cortos, muy poco pelosas y de color algo mas oscuro: UVAS mas pequeñas, mas redondas.

(1) El autor del tratado de los jardines que cité en la pag. 128 quiso acreditar su obra con el nombre de La Quintinye ocultando el propio. No pudiendo pues dar á conocer con él este vidueño que habia determinado dedicarle, he resuelto distinguirlo con el de La Quintinye y obsequiar así á un tiempo á entrambos Agrónomos.

(2) La dedico á su descubridor Antonio BERNAL que ha contribuido con sus grandes conocimientos prácticos á la perfeccion de esta obra. Véase la pag. 12.

Observacion. La *vitis vulpina* de Jacquin se parece á esta variedad mas que á ninguna otra de las que yo describo. No he visto de ella sino la excelente estampa que cité ántes (pág. 169), en la qual podrán reconocerse los detalles de la flor y semilla muy aumentadas.

Se cultiva en Miraflores, pago de Sanlucar.

67. - PERRUNO DURO. *FIRMISSIMA.*

Estampa de los caracteres de la vid comun, fig. 3.

PERRUNO DURO en Arcos, Espera y Paxarete.

PERRUNO DE LA SIERRA *ibid.*

SARMIENTOS algo duros: HOJAS muy peludas: UVAS blancas duras.

RAMIS duriusculis: FOLIS hirsutissimis: ACINIS albis duris.

CEPA brota muy temprano.

SARMIENTOS tendidos, largos, medianamente gruesos, rollizos, pardo-blanquizcos: cañutos algo largos: nudos gruesos: rebuscos muy pocos. NIETOS muy pocos.

HOJAS medianas, algo irregulares, palmeadas; con los senos muy ensanchados: gajos cinco, algo cortados muy comunmente, puntiagudos, sobrepuestos: dientes largos: CABILLO liso, blanco-rojizo, en ángulo agudo con la hoja.

RACIMOS muchos, grandes, muy apretados: gajos los superiores largos: agracejo ninguno: uva menuda ninguna: PEZON correoso, verde-rojizo.

UVAS casi iguales, muy obtusas, con la superficie igual, bastante carnosas, algo ásperas, tardias: hollejo delgado.

Pesó su mosto en Paxarete en 2 de Octubre 14 grados.

Observacion 1ª. Sus racimos comparecen todos verticales ó con la punta dirigida al cielo al salir de la yema qualquiera que sea la situacion de esta. Ant. Ruiz.

Observacion 2ª. Sus uvas resisten mucho á las causas que pudren las de otras variedades.

Se cultiva en manchas en los lugares arriba citados.

TRIBU IX.

VIGIRIEGOS. PROSTRATÆ.

SARMIENTOS postrados muy tiernos: HOJAS amarillentas: UVAS grandes blandas.

RAMI prostrati tenerrimi: FOLLA lutescentia: ACINI magni molles.

68. - VIGIRIEGA COMUN. PROSTRATA.

VIGIRIEGA en Sanlucar, Xerez, Trebugena, Rota, Chipiona, Puerto de Santa María, Arcos, Espera, Páxarete, Tarifa, Algeciras, Málaga, Timar, Poqueira, Pitres, Uxixar y otros pueblos de la Alpujarra.

UVAS casi redondas blanco-verdosas.
ACINIS subrotundis albo-viridibus.

VIGIRIEGO. *García de la Leña, loc. cit. pag. 25.*

CEPA mediana, brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS muchos, muy largos, delgados, rollizos, pardo-rojizos: cañutos cortos: rebuscos muchísimos.

HOJAS medianas, casi orbiculares, casi enteras, algo lustrosas en su haz superior, casi lampiñas en la inferior: dientes medianos. CABILLO lampiño, de color rojo claro, en ángulo casi recto con la hoja.

RACIMOS pocos, medianos, poco apretados, con bastante *agracejo*. PEZON tierno.

UVAS muy obtusas, con la superficie igual, muy dulces, tempranas: *hollejo* algo grueso. ANILLO muy poco marcado.

Su mosto se reputa muy bueno para vino, y según La Leña hace buena mezcla con el de la Tintilla.

De sus uvas se hacen en Málaga pasas de lexia.

Es la mas comun en Tarifa despues del Listan comun.

Se cultiva en manchas en los demas lugares nombra-

dos arriba ; pero en pocos hacen vino de ella porque la estiman mucho para comer sin embargo de que es algo empalagosa.

69. - VIGIRIEGA NEGRA. *CATONIS* (1).

VIGIRIEGA NEGRA en Sanlúcar y Xerez.

UVAS negras.

ACINIS nigris.

Solo difiere de la anterior por sus HOJAS con los *senos* mas profundos y algo ensanchados en la base: RACIMOS mas ralos, con el PEZON morado ; y por el color de la UVA y su sabor que es algo agrio.

Es muy rara en Sanlúcar y muy comun en las viñas de Xerez.

70. - DE BIDEZ. *BIDEZI* (2).

UVAS oblongas blanco-verdosas.

ACINIS oblongis albo-viridibus.

Difiere ademas de la Vigiriega comun por sus SARMIENTOS menos tendidos y algo mas cortos : HOJAS con los *senos* algo mas profundos menos amarillentas: UVAS mas jugosas mas blandas y menos dulces.

Se cultiva en Munibe, pago de Sanlúcar.

TRIBU X.

AGRACERAS. *OXICARPÆ*.

HOJAS de un verde obscuro : UVAS medianas redondas, ó muy grandes y algo alargadas, algo acidas.

(1) Variedad dedicada al gran M. P. CATON, fundador de la Ampelografía. Véase la pag. 114.

(2) Dedico esta variedad á Mr. BIDEZ. Véase su art. en la pag. 127.

FOLIA intensè viridia: *ACINI* mediocres rotundi, aut *maximi oblongiusculi*, subacidi.

La voz griega *Oxycarp* significa lo mismo que la de *Agraceas*, à saber, las de fruto agrio. Se compone de *oxys* agrio y *καρπις* fruto.

71. - BLANQUECINA. *ALBICANS.*

SARMIENTOS blanquizcos duros: *RACIMOS* medianos: *UVAS* medianas negras tardias.

RAMIS albicantibus duris: *RACEMIS mediocribus*: *ACINIS mediocribus nigris serotinis.*

CEPA brota muy tarde.

SARMIENTOS tendidos, algo largos, delgados, pardo-blanquizcos con una ligera tintura de verde: *cañutos* medianos: *rebucos* bastantes. *NIETOS* muchos.

HOJAS medianas, enteras, ó casi enteras, algo lustrosas en su parte superior, casi enteramente lampiñas en la inferior, algo cóncavas al madurar el fruto, caen muy tarde: *dientes* cortos. *CABILLO* rojizo, en ángulo algo agudo con la hoja.

RACIMOS algo apretados. *PEZON* verde.

UVAS de siete líneas de diámetro, redondas, muy obtusas, con la superficie igual, algo blandas, agrias: *hollejo* grueso.

Se cultiva en el Rebenton grande, pago de Sanlucar, hacienda llamada del Rey.

72. - DE SOTO. *SOTI* (1).

SARMIENTOS blanquizcos duros: *RACIMOS* grandes algo oblongos: *UVAS* medianas negras tardias.

RAMIS albicantibus duris: *RACEMIS magnis oblongiusculis*: *ACINIS mediocribus nigris serotinis.*

Difiere ademas de la anterior en que echa menos *rebucos* y por sus *UVAS* algo mas gruesas y no tan tardias.

(1) La he nombrado *SOTI* en obsequio de Francisco Soto, capataz muy instruido de Don Jacobo Gordon en Xerez.

Observacion. El racimo de esta variedad es muy semejante al de la Vigiriega negra; pero se distingue de él fácilmente por su pezon verde y por sus uvas mas chicas mas redondas y menos negras.

Se cultiva en el Hornillo, pago de Sanlucar, hacienda de D. Antonio Lopez.

73. - MELONERA. *VITTATA*.

Estampa XX.

MELONERA en Sanlucar y en Xerez.

RAYADA en Granada.

UVAS negras con fajas negro-grises.

ACINIS nigris nigro-griseo-fasciatis.

CEPA grande, brota muy temprano.

SARMIENTOS pocos, tendidos cortos, algo delgados, rollizos, blanco-verdosos ó verde-blanquicos con una ligera tintura de rojo en su parte superior, blandos; rebuscos muy pocos. NIETOS muchos, cortos.

HOJAS como en la Blanquecina.

Estambres persisten muchos estirados madura ya la uva.

RACIMOS muchos, grandes (de un pie de largo), casi cilindricos, algo apretados, con bastante *agracejo*. PEZONCITOS muy verrugosos, con el *rodete* bastante abultado.

UVAS medianas (de cinco líneas y media de largo con cinco ó poco mas de grueso), muy obtusas, con la superficie igual, con 8 - 13 listas negro-grises que corren desde el ápice hasta la base ensanchándose en el vientre de la uva y se borran en parte ó desaparecen del todo limpiando á esta de su pruina, duras, de sabor áspero mezclado con acidez, tardías. ANILLO compuesto de seis *glandulas* reunidas por su parte inferior, casi imperceptibles. SEMILLAS de una á tres.

Observacion. Las fajas que distinguen á esta variedad

son verde-blanquizas ó blanco-verdosas mientras la uva está en agraz.

Se cultiva una mancha de esta variedad en Sanlúcar pago del Rebenton grande, viña del Beloni; algunas cepas en Plantalina, pago de Xerez; una parra en un carmen del Darro en Granada y algunas en su arrabal del Fargue.

El Conde de los Corbos la tiene también en los emparados de su Huerta inmediata á las de Luche fuera de la puerta de Segovia en Madrid.

Me han asegurado que se cultiva también en el Reyno de Córdoba.

74 - AGRACERA. FLORENTISSIMA.

AGRACERA en Sanlúcar, Xerez, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete, Moguer y Conil.

Pezon muy tierno: UVAS muy grandes negras.
Pedunculo tenerrimo: ACINIS maximis nigris.

CEPA delgada, brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS muchos, tendidos, cortos, muy delgados, blanco-verdosos, alguna vez blanco-rojizos en su parte superior, sumamente blandos. NIETOS muchos, muy largos, con muchísimos rebuscos.

HOJAS pequeñas, algo irregulares, enteras ó casi enteras, lustrosas en su parte superior, casi enteramente lampiñas en la inferior, caen muy tarde: *dientes* medianos. CABILLO de color rojo muy subido que se extiende á tefir la base de los nervios, en ángulo recto con la hoja.

RACIMOS pocos, pequeños y ralos por lo comun, á veces grandes y bastante apretados en las parras, con muy poco *agracejo*.

UVAS muy obtusas, con la superficie igual, duras, bastante carnosas: *hollejo* grueso.

Su mosto contiene tan poco azúcar que muchas veces ni aun llega á fermentar.

Observacion 1ª. Esta variedad echa flores hasta fines de Agosto, tiempo en que ya han madurado sus primeros ra-

cimos: los últimos se cogen de los emparrados á últimos de Noviembre con las uvas de color morado claro y muy agrias todavía, no pudiendo ya esperarse que lleguen á madurez perfecta.

Observacion 2ª. Luego que brota suelen despuntarle los sarmientos para que cargue de nietos y rebuscos. Algunos repiten esta operacion hasta fines de Agosto con la seguridad de lograr siempre nuevas flores.

Son muy comunes los emparrados de este vidueño en los lugares arriba citados. Se encuentran además algunas cepas de él en las viñas de Sanlucar y Xerez.

75. - LANGLEYA. *LANGLEYA* (1).

Pezon negro muy correoso; UVAS muy grandes negras. Pedunculo nigro valde flexili: ACINIS maximis nigris.

Difiere además de la anterior por sus RACIMOS un poco mas largos, ménos gruesos y mas apretados: UVAS algo mas chicas, mucho mas negras y algo mas tempranas.

Se cultiva en Santa Brigida, pago de Sanlucar, traída de Inglaterra segun me dixerón.

TRIBU XI.

FERRARES. *PERGULANÆ.*

SARMIENTOS tendidos: HOJAS de color verde-amarillento: UVAS poco apiñadas redondas duras sabrosas.

RAMI prostrati: FOLIA viridilutea: ACINI subconferti rotundi duri sapidi.

Columela llama *Pergulanæ* á los vidueños propios para emparrados, como lo son todos los de esta tribu.

(1) Variedad dedicada á Batty LANGLEY, que ha publicado algunas descripciones y estampas de las que se cultivan en Inglaterra. Véase su artículo en la pag. 126.

Estampa XXI.

FERRAR en Sanlúcar, Xerez, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete y Moguer.

SARMIENTOS tiernos: UVAS muy grandes casi negras.

RAMIS teneris: ACINIS maximis subnigris.

CEPA muy gruesa, brota muy tarde.

SARMIENTOS pocos, algo cortos, gruesos, rollizos, de color pardo-rojizo muy claro y uniforme: cañatos medianos: nudos algo gruesos: medula bastante: rebuscos muchos.

HOJAS y CABILLOS como en el Pedro Ximenez loco, excepto que aquellas son algo mayores y sus senos frecuentemente algo mas profundos.

RACIMOS grandes, de figura irregular, recompuestos en casi toda su extension, malos en las cepas, algo apretados en las parras, con tamborilete: gajos muy largos por lo comun: agracejo mucho: uva menuda alguna. PEZON largo, grueso, tierno, de color verde claro. PEZONCITOS bastante verrugosos, con las verrugas medianas, verde-amarillentas: rodete poco abultado.

UVAS de diez líneas de largo y casi igual grueso, bastante desiguales, muy obrusas, con la superficie igual, muy carnosas, agridulces, muy tardias: hollejo delgado.

ANILLO bastante marcado; compuesto de seis glandulas reunidas por su parte inferior, informes, distantes, pardas. SEMILLAS dos por lo comun, del largo regular.

Pesó su mosto en Sanlúcar en 19 y 20 de Septiembre 8 y $\frac{1}{2}$ grados.

Se cultivan cepas y parras de esta variedad en los Pueblos arriba citados, y en Malaga.

77. - FERRAR BLANCO. *SPECIOSA*.

FERRAR BLANCO en Paxarete.

CORONA DE REY en Espera.

SARMIENTOS tiernos: UVAS muy grandes blancas.

RAMIS teneris: ACINIS maximis albis.

Solo difiere de la anterior por sus SARMIENTOS mas blanquicos, con menos NIETOS y las YEMAS mas chicas: HOJAS algo mas amarillentas, y por el color de la UVA.

Se cultiva en Paxarete y Espera.

78. - JETUBÍ LOCO. JONESIA (1).

JETUBÍ LOCO en Arcos, Espera y Paxarete.

SARMIENTOS duros: UVAS muy grandes negruzcas.

RAMIS duris: ACINIS maximis nigricantibus.

BODOCAL. Fuentedueña, pag. 294?

CEPA brota muy tarde.

SARMIENTOS tendidos, muy largos, medianamente gruesos, blanquicos: cañutos largos. NIETOS pocos, largos, con muchos rebuscos. YEMAS pequeñas.

HOJAS algo grandes, enteras ó lobadas, con los senos algo ensanchados, bastante pelosas en el envés: dientes medianos. CABILLO verde-amarillento.

RACIMOS muy pocos, pequeños, ralos.

UVAS difieren de las de la anterior en que son negruzcas, algo mas duras, algo mas carnosas, algo mas dulces y no tan tardías.

Observación 1ª. En las parras del Reyno de Granada cultivan una variedad que llaman CASCABELONA en la capital y OJO DE BUEY en Baza y Somontin, la qual sospecho sea la misma que acabo de describir y la que llaman GORDAL ó de LORCA en los Velez, OCAL en Jaen y BOCAL 2 en Madrid, aunque en algunos

(1) Dedico esta variedad á J. JONES por haber descrito una nueva de Marilandia. Véase su artículo en la pag. 129.

2 En la Bocal de Madrid persisten muchos estambres ensortijados hasta que la uva acaba casi de madurar, el pezoncito es bastante verrugoso y el rodete abultado.

de estos pueblos la he observado con las hojas casi enteramente lampiñas, con uva del todo negra y de hollejo algo grueso.

Observacion 2ª. Sospecho tambien que el Jetubí loco no difiere bastante del Ferrar para considerarlo como variedad diversa.

Se cultiva para comer en los pueblos arriba citados.

79. - CALONA NEGRA. *EXQUISITA.*

Estampa XXII.

CALONA NEGRA en Xerez y Trebugena.
CARCHUNA en Motril.

UVAS medianas obtusas negras.

ACINIS *mediocribus obtusis nigris.*

Difiere ademas del Ferrar comun por sus HOJAS algo mas amarillentas: UVAS del largo de seis lineas y $\frac{1}{2}$ y casi igual grueso, de hollejo mas delgado, y de un dulce mucho mas grato al paladar, tempranas.

Observacion. En las cepas de Motril tiene este vidueño los gajos del racimo mas largos que en las del Reyno de Sevilla, echa menos agracejo y la uva mas tinta: los senos de sus hojas son menos profundos en Motril y los cabillos de un rojo vivo. Si estas diferencias fuesen mas sensibles las creeria suficientes para constituir dos variedades diversas.

Se cultiva en Xerez, cañada de Marifernandez; en Sanlúcar, pago de Maina; en Trebugena, y en algunas viñas de Motril: la estiman mucho para comer.

80. - ZUCARÍ. *SACCHARATA.*

Estampa XXIII.

ZUCARÍ en Granada y Motril.

MORAVIA en Titaguas y otros pueblos del Reyno de Valencia.

UVAS medianas umbilicadas negras.

ACINIS *mediocribus umbilicatis nigris.*

CEPA mediana, con la corteza muy adherente.

SARMIENTOS echan pocos NIETOS. HOJAS caen de las últimas. En los demas caracteres convienen el sarmiento y hojas exâctamente con los de la variedad anterior.

RACIMOS pocos ó bastantes, algo grandes ó medianos, algo irregulares, medianamente ó muy apretados: *agracejo* ninguno: *uva menuda* muy poca. PEZON mediano, medianamente grueso, tierno, verdoso.

UVAS del largo de seis líneas y algo mas de grueso, achatadas por la punta, con la superficie igual, se desprenden del *pezoncito* fácilmente, muy carnosas, de sabor dulce sumamente agradable, maduran en el tiempo ordinario: *pincel* ninguno: *hollejo* muy delgado.

Observacion 1.^a Esta variedad es una de las que mas pronto se pudren si sobrevienen lluvias mientras están en las cepas.

Observacion 2.^a Me han dicho que en las viñas y parras de Granada hay otro ZUCARÍ ROJO de racimos mas chicos y menos apretados que éste, con el qual conviene en todo lo demas.

Observacion 3.^a En la Real casa de aves del Buen Retiro he visto una variedad cuya uva se parece extraordinariamente á la del Zucari; pero se diferencia muchísimo de esta por sus hojas que son borrosas. La hizo traer de Murcia, donde se conoce con el nombre de MECHIN, Don Eusebio de Arias.

Observacion 4.^a La variedad que cultivan con el nombre de Moravia en Salmeron y otros pueblos de la Alcarria parece ser la misma que acabo de describir segun las señas que me han dado de ella.

Observacion 5.^a La MORAVIA DE MADRID es muy diversa de la de Valencia.

Se cultiva en las viñas y emparrados de los pueblos citados como una de las mas exquisitas para comer.

81. - MELCOCHA. MELLITA.

MELCOCHA ¹ en Granada.

PERCOCHA en Granada.

UVAS grandes doradas.

ACINIS magnis aurcis.

CEPA gruesa, con la corteza muy adherente, brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS muy largos, pardo-rojizos, algo broncos: rebuscos bastantes. NIETOS bastantes.

HOJAS medianas, lobadas, muy poco pelosas: dientes largos. CABILLO rojizo.

FLORES suelen caer muchas.

RACIMOS pocos ó bastantes, medianos: gajos largos: agracejo ninguno: uva menuda alguna ó mucha. PEZON mediano, duro.

UVAS de ocho líneas de largo y cerca de nueve de grueso, bastante desiguales, muy obtusas, con la superficie igual, muy traslucientes, se desprenden del pezoncito con dificultad, bastante carnosas, sumamente dulces y nada empalagosas, sumamente tempranas: hollejo muy delgado. ANILLO muy poco marcado.

Se cultiva en Granada en parras para comerla fresca y conservar colgada, pues aguanta muy bien.

TRIBU XII.

TETAS DE VACA. BUMASTI.

UVAS muy grandes aovado-subcónicas.

*ACINI maximi ovato-subconici.*Bumasti *Bumasti*: voz griega usada por los latinos compuesta de dos, que corresponden á las nuestras de Tetas¹ Debe este nombre á su sabor, comparable con el de la miel.

de vaca. Varron y otros llamaron *Bumamme* á las mismas castas.

82. - LEONADA. *SULCATA*.

Estampa de los caracteres de la vid comun, fig. 10, 11 y 22.

LEONADA en Madrid.

QUEBRANTATINAJAS en Sanlúcar, Xerez, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete, Tarifa y Moguer.

CORAZON DE CABRITO en Sanlúcar, Motril y Granada.

ZUCARÍ en algunos carmenes y viñas de Granada.

COLORADA en Santa Fe.

TETA DE VACA en Titaguas y otros pueblos de Valencia.

UVAS umbilicadas algo sulcadas rojas.

ACINIS umbilicatis subsulcatis rubris.

Vitis fructu majori, subrubro calloso, ex latiusculo in angustum obtusum tortulumque mucronem desinente, jucundi saporis. Misilimerii GERUSALEM. Panormi GEROSOLIMITANA. Messanæ cum omnibus suis convicinis BUTTUNA DI GADDU, alibi BUTTUNA DI GATTU. Sacceæ ZUCCARINA. Cupani, loc. cit. pag. 233?

LEONADO. Fuentedueña. *Trat. de las viñas*, pag. 295.

Vitis acino maximo cordiformi violaceo. CORAZON DE GALLO. Trad. del Rozier, pag. 173?

Erratas.

Núm. 540, pag. 284, despues de la linea 11 falta la siguiente: *Estampa II. Pag. 286, despues de la linea 24 falta la siguiente: Estampa III.*

Núm. 541, pag. 303, despues de la linea 13 falta la siguiente: *Estampa IV. Pag. 305, despues de la linea 14 falta la siguiente: Estampa V. Pag. 308, linea 8 dice $\Delta\alpha\psi\lambda\alpha\gamma$, léase $\Delta\alpha\psi\lambda\alpha\gamma$. Id. despues de la lin. 24 añádase la siguiente: Estampa VI*

Núm. 542, pag. 325, bórrense las lineas 18 y 19, y añádase á la 21 despues de UVAS: *casi tan gruesas como las del Mantío castellano.*