

SEMENARIO

DE AGRICULTURA Y ARTES

Del Jueves 18 de Junio de 1807.

---

*Continuacion del Ensayo sobre las variedades de la vid comun.*

*Sigue la variedad 82.*

**C**EPA muy gruesa, con la corteza muy adherente. SARMIENTOS tendidos, muy largos, gruesos, blanco ó amarillo-rojizos, ó de un pardo claro, blandos: cañutos largos. NIETOS pocos, cortos y con muy poco rebusco.

HOJAS medianas, las inferiores grandes, algo irregulares, casi enteras, á veces lobadas, con los senos agudos ó algo arredondados en segmento de elipsis, lisas y de color verde algo amarillento subido en su haz, casi lampiñas en el envés: gajos cinco, á veces algo cortados, muy puntiagudos: dientes largos. CABILLO lampiño, de un color rojizo que se extiende á teñir la base de los nervios, en ángulo casi recto con la hoja.

Estambres cinco ó seis, persisten muchos hasta que la uva comienza á pintarse.

RACIMOS pocos, medianos ó algo grandes, cilíndrico-subcónicos, poco y bastante apretados: gajos cortos: agracejo muy poco: uva menuda muy poca. PEZON mediano por lo comun, á veces largo, algo tierno, de un verde claro. PEZONCITOS muy verrugosos, con el rodete bastante abaltado.

UVAS con la punta roma y como truncada, señala-

da ordinariamente con un hoyito en que puede esconderse la cabeza de un alfiler grueso ; muy convexas en su mitad y hácia la base, donde se notan por lo comun unas protuberancias longitudinales (de 4 á 7) que suelen llegar hasta la punta, de color rojo muy claro por lo regular hácia la base, se desprenden del pezoncito con alguna dificultad, muy duras, muy carnosas, de sabor dulce un poquito áspero y algo agradable, maduran en el tiempo que las mas : *píncel* ninguno : *estigma* muy persistente, á veces excéntrico : *hollejo* delgado. ANILLO muy marcado, simple, de cinco ó seis lados, pardo-rojizo. SEMILLAS ordinariamente tres, pardo-blanquizas.

*Observacion 1ª.* El color rojo de la uva de esta variedad suele ser muy claro en los emparrados y aun desaparecer casi enteramente, segun lo he visto en algunos racimos de Granada. Su tamaño varia tambien bastante, aunque siempre es considerable y á proporcion que disminuye es por lo ordinario menos irregular la figura de la uva. En las viñas de Sanlucar he visto las mayores uvas de esta variedad, en las de Titaguas las menores, que suelen ser perfectamente aovadas, mas largas que las grandes á proporcion de su grueso, y tienen el ombligo y especialmente los sulcos muy poco ó casi nada marcados.

*Observacion 2ª.* D. Juan del Vao (pág. 252) describe una UVA blanca que llaman DE MALTA, y que al parecer solo se diferencia de esta en el color. Tambien me dixeron que en una viña de Espera se encontraba el QUEBRANTATINAJAS BLANCO.

Se conserva colgada para comer en invierno.

Se encuentran algunas cepas y emparrados de esta variedad en los pueblos arriba citados, y una parra en Cádiz.

### 83. - CORAZON DE CABRITO. *EXSUCCA.*

CORAZON DE CABRITO en Santa Fé.

HOJAS poco pelosas: UVAS negras.

FOLIIS *subpilosis* : ACINIS *nigris*.

UVA DE MALTA Ó DE LA CRUZ DE MALTA. *Valcarc. loc. cit. pag. 34?*

SARMIENTOS algo delgados, con el *cañuto* mediano, de color pardo-rojizo algo amarillento y poco subido.

HOJAS algo grandes, casi orbiculares, casi enteras, con el *seno de la base* un poco ensanchado, algo rugosas y de color verde algo amarillento que se llena de manchas rojas al tiempo de madurar la uva en su parte superior, casi del todo lampiñas en la inferior: *dientes* cortos y algo arredondados. CABILLO de color verde muy amarillento, á veces rojizo, en ángulo casi recto con la hoja.

RACIMOS pocos, algo pequeños, de figura irregular, muy ralos: *gajos* largos: *agracejo* ninguno. PEZON largo, todo herbáceo, tierno, verde. ESCOBAJO delgado. PEZONCITOS poco verrugosos, con el *rodete* poco abultado.

UVAS de doce líneas de largo y nueve por lo mas grueso, muy desiguales, ventrudas y por lo comun algo angulosas en su parte superior, adelgazadas ordinariamente y casi cilindricas en el tercio inferior, algo encorvadas casi siempre por el lado que mira al escobajo, con un ombliguito en la punta tanto menos marcado quanto son mas largas, de color negro algo claro que suele ser rojizo en su parte superior, se desprenden del pezoncito con dificultad, muy crugientes, sumamente carnosas, de sabor dulce muy remiso y algo agradable, maduran en el tiempo que las mas: *píncel* muy pequeño ó ninguno: *hoyuelo* muy pequeño: *estigma* muy persistente, á veces excéntrico: *hollejo* sumamente delgado. ANILLO bastante marcado, estrecho, simple, anguloso, de color pardo-amarillento algo claro. SEMILLAS dos ordinariamente, blanco-amarillentas.

*Observacion 1ª.* La uva de esta variedad es la mas enjuta ó menos jugosa que he visto. Se observan regularmente en su interior junto al ápice de las semillas y entre estas algunos intersticios del todo vacíos.

*Observacion 2ª.* En el Real Jardin botanico de Ma-

dríd la llaman unos Jardineros LEONADA NEGRA y otros TETA DE VACA NEGRA, segun que la creen mas afine á la Leonada ó á la Teta de vaca blanca del pais. Se acerca particularmente á la primera por la irregularidad y variabilidad de la figura de la uva, especialmente en su parte superior que á veces tiene sulcos poco marcados, por el tamaño de la misma que varía tambien mucho, y por los caractéres que presenta mascándola. Pero la figura de la uva considerada en general y los caractéres del racimo dan á su fruto un porte algo mas parecido al de la Teta de vaca de Madrid que al de ninguna otra.

La he examinado en el emparrado de dicho Jardín botánico, á donde la hizo traer de Barcelona, segun tradicion, D. Antonio Palau quando era Profesor del Establecimiento. Habiéndola enseñado á un viñero muy inteligente de Santa Fe, me aseguró éste que se conocia en su pueblo con el nombre de Corazon de cabrito.

84. - MARTINECIA. *MARTINECII* (1).

*Estampa XXIV.*

UVAS aovado-subcónicas algo doradas.

ACINIS ovato-subcónicos subaureis.

CEPA muy gruesa, brota muy temprano.

SARMIENTOS muchos, tendidos, largos, delgados, de color rojo-parduzco muy subido, blandos: rebuscos muy pocos. NIETOS bastantes.

HOJAS y CABILLO como en la Leonada.

RACIMOS muchos, sumamente grandes, algo ralos, sin *agracejo*. PEZON correoso, algo rojizo.

UVAS muy obtusas, con la superficie igual, duras, muy carnosas, de sabor dulce un poquito aspero algo agradable, tempranas: *hollejo* algo grueso.

(1) La dedico á Don Juan Antonio MARTINEZ de Eguilaz que la cultiva entre otras variedades muy raras y preciosas, cuyas descripciones he ilustrado con las noticias que se sirvió comunicarme generosamente.

Sus racimos se conservan muy bien colgados.  
Solo la he visto en Munibe, pago de Sanlúcar.

85. - SANTA PAULA DE GRANADA. *LONGISSIMA*.

SANTA PAULA en Granada, Baza, Somontin, Cuevas y otros pueblos del río Almanzora, Bayarque y Sorbas.  
TETA DE VACA BLANCA <sup>1</sup> en Madrid, Ocaña, Málaga y otros pueblos de Andalucía.

CORAZON DE CABRITO en Córdoba y Jaen.

اصابع العذاري (DEDOS DE DONCELLA) en Marruecos.

UVAS adelgazadas por ambas extremidades blancas.

ACINIS utrinque attenuatis albis.

اصابع العذاري هو صنف من العنب طوال كالبلوط ويسمي  
بعض السواحل من بلاد الاندلس العنب البقرى \*

(DEDOS DE DONCELLA. Es una variedad de uva larga como la bellota. En algunas partes de las costas de Andalucía se llama UVA DE VACA). *Ebn Elbeithar*.

\* كتاب الجامع الكبير في الدوية المفردة \*

(Libro de la colección grande de los medicamentos simples), artículo عنب (Uva) <sup>2</sup>.

*Vitis ex candido paululum flavente, duriusculo fructu-majori, longo, curva cuspidate, Vulgo BUTTUNA DI GADDU. Mes-sanae CURNIOLA. Cupani, loc. cit. pag. 233?*

*Vitis oblongo acino sesquipollicem longo et incurvo, colore viridi, albescente, sapore subdulci. СМОЧНО. Garidel, Hist. des plant. pag. 455?*

TETA DE VACA. Fuentedueña, loc. cit. pag. 203.

*Vitis acino longissimo cucumeriformi albedo. CORNICHON BLANC. Du Hamel, Traité des arbres, pag. 213.*

<sup>1</sup> A ninguna otra le conviene mejor este nombre.

<sup>2</sup> El P. Fr. Patricio de la Torre, á quien debo este artículo del Beitar sacado de un códice manuscrito que posee y está traduciendo para darlo á luz, ha observado la Santa Paula de Granada en el imperio de Marruecos, en Andalucía y en Madrid, y piensa como yo á vista de la identidad de caracteres y de nombres, que conserva la planta en dichos países, que sea los mismos *Dedos de doncella* descritos en Africa seis siglos ha por aquel sabio Arabe malagueño.

WHITE CUCUMBER GRAPE. Weston, *The univers. Botanist*, pag. 154.

CARA ó TETA DE VACA. Valcaro. *loc. cit.* pag. 24 y 33 ?

UVA DE AFRICA. *Id.* pag. 47 ?

TETA DE VACA. Del Vao, *ib.* pag. 252 ? y La Leña, *loc. cit.* pag. 33 ?

XXXV. TETA DE VACA, VEGIGA DE PEZ. Traduc. del Rozier, *loc. cit.* pag. 173.

TETA DE VACA BLANCA. Bouzelou, *loc. cit.* pag. 333.

CEPA brota tarde.

SARMIENTOS rollizos, medianamente duros, con pocos rebuscos y pocos NIETOS.

HOJAS algo pequeñas, palmeadas ó lobadas; con los senos agudos, bastante amarillentas en su haz y casi lampiñas en el envés: *gajos* cinco.

RACIMOS muchos, muy grandes, de figura irregular, ralos: *gajos* largos: *agracejo* poco: *uva menuda* poca. PEZON algo largo, muy tierno, verdoso. ESCOBAJO delgado. PEZONCITOS bastante verrugosos, con el rodete poco abultado.

UVAS del largo de pulgada y media con diez líneas de grueso cerca de su mitad, adelgazadas ácia el pezoncito hasta no tener en su union con este mas que cinco líneas de grueso, y aun mas ácia la punta cuyo diámetro es ordinariamente de tres líneas, bastante desiguales, con *ombliigo* á veces muy poco marcado, un poco encorvadas ordinariamente por el lado que mira al escobajo correspondiendo una convexidad en el opuesto, blancas, á veces algo amarillas, muy traslucientes, se desprenden del pezoncito con dificultad, crugientes, muy carnosas, casi insipidas, tardías: *venas* sumamente manifiestas: *pin-cel* ninguno ó muy pequeño: *hoyuelo* muy pequeño (tiene apénas una línea de diámetro): *estigma* muy persistente: *hollejo* sumamente delgado. ANILLO muy marcado, compuesto de *glándulas* oblongas. SEMILLAS comunmente dos, nunca (que yo haya visto) mas de tres, muchas veces una sola ó ninguna, notablemente mas largas y menos

gruesas á proporcion que lo ordinario.

Sus racimos se conservan colgados bastante bien.

*Observacion 1ª.* El ser crugiente y nada empalagosa, junto con su rara figura, casi ningun hollejo y un tamaño extraordinario, hace sin duda ilusion á favor de esta uva hermosísima, á pesar de su sabor remiso y nada delicado.

*Observacion 2ª.* La descripcion que traen Du Hamel y Rozier de la hoja de este vidueño es algo diversa de la mia: sin embargo no puedo dudar de que los tres hablamos de uno mismo. Sospecho que la suya se hizo sobre individuos muy lozanos ó viciosos, podados con poca inteligencia: los que yo he observado se habian podado por quien conoce bien que madera se debe cortar, y como para que una planta vigorosa dé mucho fruto y menos hoja y leña. De ahí debió resultar que los de Rozier y Du Hamel tuviesen la hoja grande y casi entera, los racimos chicos y la uva menos gruesa.

Hay algunas parras de ella en los lugares arriba citados.

### 86. - CASCO DE TINAJA. *MACROBOTRYS.*

#### CASCO DE TINAJA en Motril.

HOJAS pelosas ó algo borrosas: UVAS negras.

*FOLII pilosis subtomentosisque: ACINIS nigris.*

HOJAS medianas, casi enteras, algo lustrosas y verde-amarillentas en su parte superior, cubiertas en la inferior de un pelito muy corto que á veces se entrelaza formando ya borra: *dientes* medianos. CABILLO de color rojo bastante vivo.

RACIMOS muy grandes, flojos: *gajos* largos: *agra-cejo* poco. PEZON largo, tierno, blanco-amarillento.

UVAS del largo de una pulgada y siete líneas y media de grueso, bastante desiguales, traslucientes, menos negras y mas tardias que las de la Calona negra, con la

qual conviene este vidueño en los caracteres que no se han expresado.

*Observacion.* Por la descripción de la hoja se ve que esta variedad debería colocarse al principio de la sección en que se halla sino fuese por otros caracteres importantes, especialmente del fruto, que exigen la pongamos aquí.

Se aprecia mucho para comer en Motril, donde tienen de ella algunas cepas.

### TRIBU XIII.

#### CABRIELES. OLEAGINEÆ.

HOJAS de color verde obscuro: UVAS medianas ó grandes oblongas duras ásperas, ó muy grandes y sabrosas.

*FOLIA* intensè viridia: *ACINI* mediocres aut magni oblongi duri austeri, seu maximi sapidi.

La voz *Oleagineæ* es tomada de Plinio que la aplica á una variedad por parecerse en su forma á la aceituna: convienen en esto todos los *Cabrieles*.

#### 87. - CABRIEL. RUBRA.

SARMIENTOS blanquicos con fajas longitudinales rojas tiernos: dientes de las HOJAS cortos: UVAS medianas ó grandes negras.

*RAMIS* albicantibus longitudinaliter rubro-fasciatis teneris: *FOLIORUM* dentibus brevibus: *ACINIS* mediocribus magnisque nigris.

TORRALBO. Fuentedueña, loc. cit. pag. 295.

TETA DE NEGRA. La Leña, loc. cit. pag. 33.

CEPA delgada, brota temprano.



**SARMIENTOS** pocos, tendidos, largos, delgados, pardo-rojizos en su parte inferior, pardo-blanquicos en la superior, listados (principalmente en los ramos jóvenes y en las puntas) de un rojo muy vivo, blandos: cañutos medianos: *rebuscos* pocos.

**HOJAS** pequeñas, enteras ó casi enteras, casi lampiñas en el envés, algo cóncavas al madurar el fruto. **CA-BILLO** de color rojo muy subido, ordinariamente en ángulo agudo con la hoja.

**RACIMOS** medianos, bastante apretados, sin *agra-cejo*. **PEZON** correoso y verde.

**UVAS** de ocho líneas de largo y seis y media de grueso (en las parras llegan á tener mas de diez líneas de largo con ocho y media ó mas de grueso), oblongo aovadas, obtusas, con la superficie igual, duras, bastante carnosas, tardías: *hollejo* grueso. **ANILLO** bastante marcado, compuesto de cinco ó seis *glándulas* pequeñas, casi orbiculares y amarillas.

*Observacion 1.<sup>a</sup>* Este vidueño tiene en cada uva el número ordinario de semillas, que es de dos ó tres: en una mas gruesa que las demas hallé cinco muy robustas, en otra quatro perfectas y una abortada. Este es el único caso en que he visto una vez el número de semillas que suponen los autores debe tener la uva.

*Observacion 2.<sup>a</sup>* El vidueño que cultivan en Madrid con el nombre de **TORRALBO** me parece el mismo que acabo de describir. En el Real Jardin botánico y en el Buen-Retiro varían un poco sus uvas en el tamaño, figura mas ó menos prolongada y color mas ó menos negro. Los individuos que tienen la uva mas negra, larga y aovada se distinguen con el nombre de **TORRALBO NEGRO** y no se diferencian nada de unos que traxeron á D. Eusebio Arias de Cataluña con el de **CUELLO DE MADA**, y se cultivan en los Jardines de la Real Casa de aves del Buen-Retiro.

*Observacion 3.<sup>a</sup>* El racimo de esta variedad se asemeja mucho al del Vigiriego negro, del qual se distingue por su pezon verde y uvas menos gruesas en las ce-

pas, oblongo-ovadas, mas apiñadas, algo mas negras, menos jugosas y dulces, y de hollejo mas grueso.

Es rara en las viñas de Sanlucar.

88. - JETUBÍ BUENO. *PLINIANA* (1).

JETUBÍ BUENO en Arcos, Espera y Paxarete.

SARMIENTOS blanquizcos algo duros: dientes de las HOJAS cortos: UVAS medianas negras.

*RAMIS albicantibus duriusculis: FOLIORUM dentibus brevibus: ACINIS mediocribus nigris.*

Difiere del Cabriel por sus SARMIENTOS algo eriguídos, mas cortos y duros, y que brotan muy tarde: RACIMOS mas grandes y UVAS mas tardías. Es medianamente esquilmeña.

*Observacion.* He visto muchos racimos de este vidueño partidos por la punta en dos gajos iguales, lo que llaman *ser mellizos por la punta.*

Se cultiva en los lugares arriba citados.

89. - ATaubí. *PRÆDURA.*

*Estampa XXV.*

ATAUBÍ en Granada, Motril, Lanxaron, &c.

UVA DE RAGOL en Sorbas.

UVAS muy grandes verdes.

*ACINIS maximis viridibus.*

*PALOP ASPRE.* Del Vao, loc. cit. pag. 253?

CEPA brota muy tarde.

SARMIENTOS tendidos, rojo-parduzcos, broncos: rebuscos muchos por lo comun. NIETOS bastantes.

HOJAS algo grandes, casi enteras ó lobadas, con los

(1) Variedad dedicada al inmortal Plinio, Príncipe de los Naturalistas antiguos y émulo del mejor Agrónomo del Imperio romano. Véase su artículo en la pag. 116.

senos algo ensanchados, casi lampiñas en su envés: *dientes* medianos. CABILLO rojizo.

RACIMOS algo pequeños ó medianos, bastante apretados por lo comun, á veces algo ralos: *agracejo* mucho: *uva menuda* mucha. PEZON muy tierno, verde.

UVAS de poco mas de once líneas de largo con ocho de grueso, disminuyendo éste hácia la punta linea y media quando mas, algo desiguales, con la superficie igual, bastante traslucientes, se desprenden del pezoncito muy difícilmente, muy duras, muy carnosas, sumamente tardías: *venas* muy manifiestas: *pincel* ninguno: *hollejo* algo delgado. ANILLO poco marcado.

Ninguna uva de quantas yo conozco se conserva mejor colgada que la Ataubí.

*Observacion 1ª.* Este vidueño echa siempre mucho fruto, pero tan desmedrado algunos años que todo se vuelve rebuscos, y si los bochorros (en Granada son los sudestes) lo asolanan por el verano suelen quedar muy menudas todas las uvas y muy ralo el racimo.

*Observacion 2ª.* En el año 1804, sin embargo de haber sido uno de los mas tempranos, no se cogieron en Granada las uvas de este vidueño hasta mitad de Octubre, tiempo en que estaban todavía verdes, y en que podian ya madurar muy poco mas segun el frio que hacia. Suelen tambien cogerse anticipadamente por libertarlas de los páxaros, ratones y otros vichos que las destruyen.

*Observacion 3ª.* Se parece mucho esta variedad á una que llamau CANON TARDÍO en Titaguas y otros pueblos de Valencia.

Se cultiva mucho en los parrales y viñas de Lanxaron; bastante en los parrales de Granada, y algo en los de Sorbas. En Motril solo he visto de ella algunas cepas en la viña de García.

90. - SANTA PAULA DE XEREZ. *PRÆGRANDIS.*

SANTA PAULA en Xerez.

*Pezon* rojo: *UVAS* muy grandes rojas.

Pedunculo rubro: ACINIS maximis rubris.

Difiere además del Cabriel por sus HOJAS con los senos algo más profundos, los dientes más largos, de color menos subido: RACIMOS muy grandes: UVAS menos duras, de hollejo más delgado, dulces.

*Observacion.* Creo haber visto esta variedad cerca de Jaen, y que se conoce allí con el mismo nombre que en Xerez. Es muy afine á ella la que llaman en Madrid SAN DIEGO.

Es rara en las viñas de Xerez.

91. - MORAVITA. GARIDELI(1).

MORÁVITA en Xerez.

JALDONA en Motril.

Pezon verde: UVAS muy grandes negras.

Pedunculo viridi: ACINIS maximis nigris.

SARMIENTOS de color pardo-rojizo muy subido en las cepas y verdes ó algo rojizos en las parras. HOJAS medianas, de un verde obscuro en las parras, algo amarillentas en las cepas, casi lampiñas en el envés. CABILLO verde muy poco rojizo, ó de color rojo vivísimo que suele extenderse por los nervios hasta una pulgada y aun teñirlos enteramente en las hojas de la punta. RACIMOS grandes, ralos ó algo apretados, con poco ó ningun agracejo. UVAS de una pulgada ó poco más de largo y siete líneas y media de grueso, casi iguales, oblongas, traslucientes, de hollejo muy delgado, de sabor poco dulce pero grato al paladar, más tempranas que las del Cabriel, con el qual conviene esta variedad en todos los demás caracteres. SEMILLAS de una á tres.

*Observacion 1ª.* Sus uvas no llegan á ponerse enteramente negras en las parras.

(1) Dedico esta variedad al botánico Garidel, porque no creyó ajenas de su apreciable Flora provenzal las definiciones de los vidueños. Véase su artículo en la pag. 125.

*Observacion 2ª.* Se parece mucho á una variedad que cultivan en los parrales de Titaguas y otros pueblos de Valencia con el nombre de SAN GERÓNIMO y á la MORAVIA DE MADRID.

Solo he visto una parra de este vidueño en Xerez, y algunas cepas en Motril.

92. - ARROBAL. *OVATA.*

ARROBAL en Bornos.

UVAS medianas rojas.

*ACINIS mediocribus rubris.*

Difiere ademas del Cabriel por sus HOJAS inferiores mas grandes: RACIMOS mas largos, con los *gajos* mas largos: UVAS mas adelgazadas por la punta, mas traslucientes y mucho mas tardias.

Solo he visto una parra de esta variedad en Bornos.

TRIBU XIV.

DATILERAS. *DACTYLIDES.*

SARMIENTOS postrados: UVAS delgadas oblongas algo duras dulces.

*RAMI prostrati: ACINI graciles oblongi duriusculi dulces.*

Llamaban *Dactylides* y tambien *Dactyli* los latinos á unas uvas largas y delgadas como los *dedos* (*δακτύλιος*).

93. - DE RAGOL. *DACTYLUS.*

CASTA DE RAGOL en Uxixar, Lubrin y otros pueblos de la sierra nevada y de Filabres.

DATILILLOS en Timar y pueblos inmediatos.

UVAS rojas

*ACINIS rubris.*

No he observado los SARMIENTOS.

HOJAS medianas, lobadas, verde-amarillentas, casi enteramente lampiñas.

RACIMOS medianos y algo claros comunmente. PEZON tierno.

UVAS de siete líneas de largo y quatro de grueso ordinariamente, pues su largo suele llegar á pulgada y media, casi iguales, con la superficie igual, teñidas ligeramente de un color rojo que suele desaparecer en las que estan siempre á la sombra y avivarse bastante en las que hiere el sol todo el dia, algo crugientes, muy carnosas, de un sabor dulce algo remiso pero agradable, tardías (maduran á fines de Septiembre): *hollejo* bastante grueso.

Es la famosa casta de Ragol, pueblo de la taha de Marchena, donde cultivan muchos parrales de ella, y conservan colgada su uva para comer y vender en invierno.

Tambien se ven algunas parras de esta variedad en los pueblos arriba citados y otros de la Alpujarra, &c.

94 - TETA DE VACA NEGRA. *TENERA*.

TETA DE VACA NEGRA en Sanlucar y Trebugena.

HOJAS de color verde obscuro: UVAS medianas negras.  
*FOLIIS obscurè viridibus: ACINIS mediocribus nigris.*

Solo difiere del Cabriel por los caractéres que van ya expresados y por los siguientes: CEPA brota algo ántes: *rebuscos* bastantes: RACIMOS algo ralos, con algun *agracejo* y el PEZON tierno: UVAS un tercio mas chicas, mas jugosas, de *hollejo* mas delgado y algo mas tempranas.

Se cultiva en el Rebenton grande, pago de Sanlucar, viña de Juan Hierro, y en Trebugena.

95. - TETA DE NEGRA. *TERETIUSCULA*.

TETA DE NEGRA en Granada, Santa Fé, Motril, &c.

UVAS grandes negras.

ACINIS magnis nigris.

Solo difiere de la anterior por sus SARMIENTOS broncos: HOJAS medianas, lobadas por lo comun, con los senos algo ensanchados, verde amarillentas, con el CABILLO verde-blanquizo: RACIMOS grandes, ordinariamente algo flojos: UVAS de cerca de una pulgada de largo y poco mas de grueso.

Se cultiva en algunas viñas de Motril y en los emparados de Granada.

96. - TETA DE VACA BLANCA. *GRACILIS.*

TETA DE VACA BLANCA en Sanlucar, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete y Moguer.

BOTON DE GALLO en Lubrin.

SARMIENTOS muy cortos: RACIMOS cortos ralos: UVAS blancas. RAMIS brevissimis: RACEMIS brevibus: ACINIS raris albis.

*Vitis mediocribus vinaceis, durulis, oblongis, candidofulvis, sapidis.* vulgo *INZOLIA VRANCA.* Cupani, loc. cit. pag. 232?

TETA DE VACA. Don Juan del Vao, loc. cit. pag. 252?

CEPA muy delgada.

SARMIENTOS muy pocos, algo erguidos, muy delgados, pardo-amarillentos, con una tintura muy ligera de rojo, muy blandos: cañutos cortos: rebucos bastantes. NIETOS bastantes.

HOJAS medianas, casi enteras, á veces lobadas y con los senos algo ensanchados, algo lustrosas y de color verde algo amarillento: dientes largos. CABILLO de color rojo claro que se extiende á teñir la base de los nervios.

RACIMOS bastantes ó pocos, chicos, ralos, sin agracejo. PEZON tierno.

UVAS medianas, algo convexas en su parte exterior y achatadas en la que toca con el escobajo, de color blanco muy poco dorado, bastante carnosas, algo tardias: hollejo delgado.

Es rara en los lugares arriba citados.

*Estampa de los caracteres de la vid comun, fig. 2.*

*Estampa XXVI.*

UVA DE LOXA en Xerez , Puerto de Santa María, Algeciras , Tarifa y Málaga.

SARMIENTOS largos: RACIMOS grandes: UVAS apiñadas blancas.  
RAMIS longis : RACEMIS magnis : ACINIS confertis albis.

UVAS DE LOXA. La Leña , loc. cit. pag. 31.

Difiere además de la anterior por sus SARMIENTOS en gran número , tendidos , medianamente gruesos , pardo-rojizos , con muchos NIETOS y muchos rebuscos : HOJAS algo pequeñas , con los dientes cortos , muy amarillentas , con el CABILLO ordinariamente blanco-verdoso y alguna vez rojizo. RACIMOS muchos , partidos muchas veces en dos por la punta , con mucho agracejo : UVAS algo mas jugosas , de hollejo sumamente delgado.

*Observacion 1ª.* En muchas uvas de este vidueño he visto el hoyuelo rodeado de cinco escamitas grandes , reunidas por su parte inferior , oblongas y pardo-rojizas , las quales son sin duda los gajos en que suele estar partida la glándula del ovario quando es única. En otras uvas son mas chicas las escamas ó casi invisibles al ojo desnudo , lo qual prueba que el carácter tomado de ellas no vale tanto como aparece por otras observaciones.

*Observacion 2ª.* Es muy afine esta variedad á la Santa Paula de Granada.

Sus uvas se extraen de Loxa en gran cantidad para el mercado de Cadiz y otros.

En Malaga embarcan muchas para Indias y otros puertos extrangeros enterradas en arena del rio y en el serrin de las duelas.

Se cultiva además en Martinazo , pago de Xerez ; en Balbaina , pago del Puerto de Santa Maria , traída de Loxa , y en las parras de Algeciras y Tarifa.