

NOTA

Rectificación a la determinación de *Thera obeliscata* (Hübner, 1787)

C. GÓMEZ DE AIZPÚRUA

Thera STEPHENS, 1831
obeliscata (HÜBNER, 1787)
Lep. GEOMETRIDAE

He de aclarar que: En el *Bol. San. Veg.*, 17. 1991, página 219, traté esta misma especie, la cual por un error mencioné como tal, siendo en realidad, *Thera firmata* (HÜBNER, 1822). Cuanto se menciona en el referido artículo es válido.

La *T. obeliscata* (Hb.), tiene el imago muy semejante a *T. firmata* (Hb.), siendo difícil diferenciarlos a simple vista, a no ser por un especialista en la familia *Geometridae* en cambio, las orugas se diferencian fácilmente debido a las siguientes particularidades.

| | <i>T. obeliscata</i> (Hb.) | <i>T. firmata</i> (Hb.) |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| Cabeza | Verde | Ocre |
| Patas torácicas | Rosas | Ocres |

En cuanto a los demás detalles, son muy parecidos entre las dos especies y prestan a confusiones.

Ambas especies se alimentan de *Pinus sylvestris* y tienen una biología y comportamiento semejantes, siendo bivoltinas y teniendo crisálidas muy parecidas, incluso en cuanto a la diversidad de sus colores.

La especie que nos ocupa, coloniza una amplia zona europea, desde el norte de Escandinavia a España, donde la densidad de su población es menor que *T. firmata* (Hb.), se encuentra en Inglaterra y Centroeuropa.



Fig. 1.—Detalle del tórax de la oruga de *Thera obeliscata* (Hb.).

Fig. 2.—*Thera obeliscata* (Hübner, 1787):
a) Oruga
b) Imago

